

CADERNO DE PROVA

Secretaria de Estado da Saúde
Edital 038/SES/2017

<http://ses.fepese.org.br>

Técnico em Enfermagem



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



20 de agosto




30 questões



12h30 às 16h30



4h de duração*



**GOVERNO
DE SANTA
CATARINA**

Secretaria de Estado da Saúde

Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

Não quero ser feliz, quero é ter uma vida interessante

O que é felicidade hoje?

Não gosto muito da palavra felicidade. Acho que é uma ilusão mercadológica. O que a gente pode estudar são as condições do bem-estar. A sensação de competência no exercício do trabalho, já se sabe, é a maior fonte de bem-estar, mais que a remuneração. Nós temos um ideal de felicidade um pouco ridículo. Um exemplo é a fala do churrasco. Você pega um táxi domingo ao meio-dia para ir ao escritório e o taxista diz: "Ah, estamos aqui trabalhando, mas legal seria estar num churrasco tomando cerveja". Talvez você ou o taxista sofram de úlcera, e não haveria prazer em tomar cerveja. Nem em comer picanha...

Em geral, somos péssimos em matéria de prazer. Por exemplo, estamos sempre lamentando que nossos filhos seriam uma geração hedonista, dedicada a prazeres imediatos, quando, de fato, vivemos numa civilização muito pouco hedonista. Por isso, nos queixamos de excessos e nos permitimos prazeres medíocres ou muito discretos.

Mas continuamos acreditando que ser feliz é ter esses prazeres que não nos permitimos. E agora?

Ligamos felicidade à satisfação de desejos, o que é totalmente antinômico com o próprio funcionamento da nossa cultura, fundada na insatisfação. Nenhum objeto pode nos satisfazer plenamente. Então, costume dizer que não quero ser feliz. Quero é ter uma vida interessante.

Mas isso inclui os pequenos prazeres?

Inclui pequenos prazeres, mas também grandes dores. Ter uma vida interessante significa viver plenamente. Isso pressupõe poder se desesperar quando se fica sem alguma coisa que é muito importante. É preciso sentir plenamente as dores: das perdas, do luto, do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo o que é ruim.

A julgar pela quantidade de fotos colocadas nas redes sociais de pessoas sorridentes, elas têm aproveitado a vida e se sentem felizes...

O perfil é a sua apresentação para o mundo, o que implica um certo trabalho de falsificação da sua imagem. Nas redes sociais, a felicidade dá status. Mas esse fenômeno é anterior ao Facebook. Se você olhar as fotografias de família do final do século XIX, início do XX, todo mundo colocava a melhor roupa e posava seriíssimo. Ninguém estava lá para mostrar que era feliz. Ao contrário, era um momento solene. É a partir da câmera fotográfica portátil que aparecem as fotos das férias felizes, com todo mundo sempre sorridente.

E a gente olha para elas e pensa: "Eu era feliz e não sabia".

Não gosto dessa frase porque contém uma cota de lamentação. E acho que a gente nunca deveria lamentar nada, em particular as próprias decisões. Acredito que, no fundo, a gente quase sempre toma a única decisão que poderia tomar naquelas circunstâncias. Então, não vale a pena lamentar o passado.

Entrevista de Dagmar Serpa com o psicanalista Contardo Calligaris. <<http://claudia.abril.com.br/noticias/contardo-calligaris-nao-querer-ser-feliz-querer-e-ter-uma-vida-interessante/>>, acesso em 12 de julho de 2017. [Adaptado].

Texto 2



<http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/06/confira-a-tira-do-armandinho-desta-sexta-feira-9828720.html>, acesso em 14/07/2017.

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base no texto 1.

- () O uso de primeira pessoa do singular ilustra o posicionamento subjetivo do entrevistado no decorrer do texto.
- () O formato do texto com perguntas e respostas caracteriza o dialogismo do gênero discursivo entrevista.
- () O entrevistado faz uso de definições genéricas e abstratas, sem fundamentar sua visão em situações práticas e cotidianas.
- () O entrevistador tece comentários no decorrer da entrevista que complementam a perspectiva do entrevistado.
- () O entrevistado alterna os pronomes “nós” e “a gente” para designar a primeira pessoa do plural, recurso que torna o texto mais formal do que se usasse apenas “nós”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F • F • F • F • V
- b. () F • V • V • V • F
- c. () V • F • V • V • F
- d. () V • V • F • F • F
- e. (X) V • V • F • V • F

2. Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o texto 1.

- a. () Para o entrevistado, uma vida interessante é sinônimo de bem-estar e de uma vida hedonista.
- b. () O entrevistado afirma que realizações cotidianas, como comer churrasco e beber cerveja, são uma ilusão mercadológica.
- c. () O entrevistado afirma que nada pode nos satisfazer inteiramente, o que significa que não adianta buscar pelo prazer e pela satisfação dos desejos.
- d. (X) Sentir dores, como perdas e fracasso, faz parte de uma vida interessante e plena, diferentemente de uma vida centrada no ideal de felicidade.
- e. () Os perfis das redes sociais retratam o compromisso das pessoas com uma vida interessante, sorridente e plena.

3. Considere os três trechos abaixo retirados do texto:

1. “[...] estamos sempre lamentando que nossos filhos seriam uma geração hedonista, dedicada a prazeres imediatos, quando, de fato, vivemos numa civilização muito pouco hedonista.” (primeiro bloco de resposta)
2. “Ter uma vida interessante significa viver plenamente. Isso pressupõe poder se desesperar quando se fica sem alguma coisa que é muito importante.” (terceiro bloco de resposta)
3. “Acredito que, no fundo, a gente quase sempre toma a única decisão que poderia tomar naquelas circunstâncias.” (quinto bloco de resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação aos trechos.

- () Em 1 e 2, o conector “quando” é usado com valores diferentes: no primeiro caso, tem valor adversativo; no segundo, tem valor temporal.
- () Em 1, a expressão “de fato” poderia ser substituída por “na verdade”, sem prejuízo de significado ao texto.
- () Em 2, o pronome átono “se” poderia ser colocado depois do verbo (fica-se), sem ferir nenhuma regra de colocação pronominal.
- () Em 2, o pronome demonstrativo “Isso” faz referência ao conteúdo expresso na frase que precede o pronome.
- () Em 3, a palavra “que” tem o mesmo funcionamento nas duas ocorrências: é uma conjunção que introduz complemento verbal oracional.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • F • F • V • V
- b. () F • V • V • V • F
- c. (X) V • V • F • V • F
- d. () F • V • F • F • F
- e. () V • F • F • F • V

4. Considere as reescritas da seguinte frase, sem prejuízo do significado e sem ferir a norma culta da língua escrita.

A sensação de competência no exercício do trabalho, já se sabe, é a maior fonte de bem-estar, mais que a remuneração. (primeiro bloco de resposta)

1. Já é sabido, que a sensação de competência no exercício do trabalho, é a maior fonte de bem-estar, mais que a remuneração.
2. Mais que a remuneração, a sensação de competência no exercício do trabalho, já se sabe, é a maior fonte de bem-estar.
3. Já se sabe que a sensação de competência no exercício do trabalho mais que a remuneração é, a maior fonte de bem-estar.
4. A maior fonte de bem-estar, já se sabe, é, mais que a remuneração, a sensação de competência no exercício do trabalho.
5. A sensação de competência no exercício do trabalho é a maior fonte de bem-estar, já se sabe mais que a remuneração.

Assinale a alternativa que indica todas as frases **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as frases 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as frases 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as frases 1, 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as frases 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.

5. Considere as afirmativas abaixo, com base nos textos 1 e 2.

1. O texto 2 é uma tirinha humorística que define objetivamente, de forma descontraída, leve e cômica, o que é empatia.
2. Os textos 1 e 2 abordam a temática de que desenvolver uma vida interessante e empática, respectivamente, não é algo natural e facilmente atingível.
3. Enquanto o texto 1 mostra verbalmente uma alternância dos interlocutores, o texto 2 ilustra um monólogo, apesar da existência visual de dois personagens.
4. O período do texto 1 “É preciso sentir plenamente as dores” (3º bloco de resposta) apresenta a mesma composição por subordinação presente na frase do primeiro quadrinho do texto 2.
5. Os textos 1 e 2 se reportam às redes sociais como responsáveis pela dificuldade de interação face a face.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

Conhecimentos Específicos

25 questões

6. Abortamento é a interrupção de uma gravidez, espontânea ou provocada, que ocorre até:

- a. () a 18ª ou 20ª semana e o embrião pesa menos que 500 g.
- b. () a 20ª semana e o produto da concepção pesa mais que 500 g.
- c. (X) a 20ª ou 22ª semana e o produto da concepção pesa menos que 500 g.
- d. () a 22ª semana e o produto da concepção pesa mais que 500 g.
- e. () a 24ª semana e o feto pesa menos que 500 g.

7. A higienização das mãos é uma medida primária, considerada como um dos pilares da prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A microbiota transitória pode ser adquirida por profissionais de saúde durante contato direto com o paciente e equipamentos contaminados e pode ser removida pela higienização simples das mãos com água e sabonete, por meio de fricção mecânica.
- () Os microrganismos multirresistentes podem se tornar parte da microbiota transitória da pele, mas não são removidos pela higienização das mãos.
- () Os produtos de higienização das mãos, quando usados de forma inapropriada, também podem ser fontes de bactérias multirresistentes.
- () Surtos de infecção hospitalar causados por bactérias multirresistentes podem estar associados à contaminação de antissépticos durante a sua fabricação ou o seu uso.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•F
- b. (X) V•F•V•V
- c. () V•F•V•F
- d. () F•V•F•V
- e. () F•F•V•F

8. Analise as afirmativas abaixo com relação à higienização das mãos:

1. A higienização simples das mãos deve ter duração de 40 a 60 segundos.
2. Na higienização antisséptica, a fricção das mãos com antisséptico deve ter duração de 20 a 30 segundos.
3. A antisepsia cirúrgica das mãos deve durar de três a cinco minutos para a primeira cirurgia, e um minuto para as cirurgias subsequentes.
4. A utilização de solução alcoólica a 70% pode substituir a higienização com água e sabonete quando as mãos não estiverem visivelmente sujas.
5. O uso de luvas substitui a higienização das mãos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

9. Ao utilizar o glutaraldeído, na desinfecção ou esterilização de materiais, o profissional de Enfermagem deve fazer uso dos seguintes Equipamentos de Proteção Individual:

- a. () luva de amianto, óculos, máscara com filtro químico e avental impermeável.
- b. () luva de borracha, óculos, máscara simples, avental e botas impermeáveis.
- c. () luva de amianto, óculos, máscara com filtro químico e botas impermeáveis.
- d. (X) luva de borracha, óculos, máscara com filtro químico e avental impermeável.
- e. () luva de amianto, óculos, máscara simples, botas e avental impermeáveis.

10. A atonia uterina é uma das causas de hemorragia pós-parto que pode colocar em risco a vida da mulher.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A massagem uterina rotineira durante o período de Greenberg é recomendada para a prevenção da atonia uterina.
- () Após a dequitação, o útero se encontra acima da cicatriz umbilical.
- () O manejo ativo do terceiro período do parto é recomendado para a prevenção de hemorragia pós-parto.
- () O risco aumentado de atonia uterina ocorre nas gestações gemelares, no polidrâmnio e na macrosomia.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•V
- b. () V•F•F•F
- c. () F•V•V•F
- d. () F•V•F•V
- e. (X) F•F•V•V

11. A hipoglicemia em adulto apresenta sinais e sintomas como tremores, sudorese, palidez, taquicardia, tonturas, cefaleia, parestesias, distúrbios visuais e rebaixamento de consciência, e também, glicemia capilar menor que:

- a. () 100 mg/dl
- b. () 80 mg/dl
- c. () 70 mg/dl
- d. (X) 60 mg/dl
- e. () 40 mg/dl

12. O técnico de Enfermagem deve conhecer a variação dos Sinais Vitais dos pacientes, para poder prestar uma assistência de qualidade.

Assim sendo, considera-se pulso normal para uma criança de 1 a 7 anos:

- a. () 60 a 70 batimentos por minuto.
- b. () 70 a 100 batimentos por minuto.
- c. (X) 80 a 120 batimentos por minuto.
- d. () 90 a 110 batimentos por minuto.
- e. () 110 a 130 batimentos por minuto.

13. Analise as afirmativas abaixo com relação às alterações da temperatura corporal.

1. Na hipertermia a pele do paciente inicialmente está fria devido à vasoconstrição e depois apresenta-se quente e a frequência respiratória aumenta.
2. A hipertermia ou febre remitente é aquela que aumenta por um período do dia, mas retorna ao normal em 24 horas.
3. Na hipotermia leve a pressão arterial se eleva devido à vasoconstrição periférica.
4. Os tremores e frios estão presentes na hipotermia leve e ausentes na hipotermia severa.
5. A produção de urina está aumentada na hipotermia severa, devido à vasoconstrição em todo o organismo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. Analise as afirmativas abaixo com relação à glicemia capilar em adultos com Diabetes Mellitus (DM).

1. É recomendada a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia a todas as pessoas com DM tipo 1.
2. É recomendada a monitorização da glicemia capilar uma vez ao dia a todas as pessoas com DM tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas.
3. Em pessoas com DM tipo 2 em uso de anti-diabéticos orais, a monitorização da glicemia capilar não é recomendada rotineiramente.
4. É recomendada a monitorização da glicemia capilar uma vez ao dia a todas as pessoas com DM tipo 1.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

15. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à oxigenoterapia.

- () A máscara de venturi é a forma mais confiável e precisa para a administração de oxigênio não invasivo, pois permite um fluxo constante de ar ambiente misturado com oxigênio.
- () A cânula nasal é a forma mais confiável e precisa para a administração de oxigênio não invasivo, sendo um método simples.
- () O cateter nasofaríngeo é usado para administração de altas concentrações de oxigênio.
- () As máscaras simples são utilizadas para baixas e moderadas concentrações de oxigênio.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • F • F
- b. () F • V • F • F
- c. () V • F • V • V
- d. () F • F • F • V
- e. (X) V • F • F • V

16. No processo de esterilização de materiais o tipo de invólucro precisa ser adequado ao método utilizado.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Em calor seco, podem ser usados: tecido de algodão, papel grau cirúrgico e papel crepado.
- () Em calor úmido, podem ser usados: tecido de algodão, papel grau cirúrgico e caixas metálicas perfuradas.
- () Em óxido de etileno, podem ser usados: papel grau cirúrgico, papel crepado e filme transparente.
- () Em radiação ionizante, podem ser usados: tecido de algodão, papel grau cirúrgico e papel crepado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • F • F
- b. () V • F • V • V
- c. () F • F • V • V
- d. (X) F • V • V • F
- e. () F • F • V • F

17. Os índices antropométricos e demais parâmetros adotados para a vigilância nutricional de adolescentes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são:

- a. () Peso por idade e Circunferência da cintura.
- b. (X) Índice de Massa Corporal por idade e estatura por idade.
- c. () Peso por idade, estatura por idade, e Índice de massa Corporal por idade.
- d. () Circunferência da cintura e Índice de Massa Corporal por idade.
- e. () Índice de Massa Corporal por idade, Circunferência da cintura e Estatura por idade.

18. O método antropométrico permite a avaliação do peso, da estatura e de outras medidas do corpo humano. Portanto ele deve ser realizado com presteza.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () O antropômetro de madeira deve ficar localizado em lugar seco, pois há o risco de o mesmo empenar com a umidade local, podendo gerar erros na medição da estatura.
- () Crianças menores de dois anos devem ser pesadas e medidas somente com fralda e na presença da mãe ou do responsável.
- () O comprimento é a distância que vai da sola (planta) dos pés descalços, ao topo da cabeça, comprimindo os cabelos, com a criança deitada em superfície horizontal, firme e lisa.
- () Quando a aferição da altura for por meio do estadiômetro, o indivíduo deve encostar os calcanhares, os glúteos e parte posterior da cabeça (região do occipital) no estadiômetro ou na parede.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•F
- b. () F•V•F•V
- c. () V•F•V•V
- d. () F•F•V•V
- e. (X) V•F•V•F

19. Em adultos, na hipotermia moderada, a temperatura oscila entre:

- a. (X) 30-32°C.
- b. () 30-35°C.
- c. () 30-36°C.
- d. () 32-35°C.
- e. () 32-36°C.

20. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à mudança de decúbito.

- () A mudança de decúbito consiste em mudar a posição do paciente acamado, proporcionando maior conforto e a fim de evitar as complicações devido à imobilidade prolongada, como as contrações musculares e lesão por pressão.
- () No decúbito dorsal horizontal, o paciente é posicionado com a cabeça alinhada com o tronco, membros superiores ao longo do corpo ou cruzados sobre o tórax e membros superiores estendidos ou levemente fletidos.
- () No decúbito lateral, a cabeça deve ficar em posição anatômica, ombro posicionado mais à frente, apoio anterior para o membro superior de cima, joelhos semifletidos, sempre com travesseiros entre eles e apoio no dorso com travesseiro ou coxim em ângulo de 30°.
- () Durante a mudança de decúbito de paciente acamado, o profissional de Enfermagem deve inspecionar as condições da pele do paciente, principalmente os pontos mais sensíveis para o surgimento de lesões por pressão.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•V
- b. () V•V•F•V
- c. (X) V•F•V•V
- d. () F•V•V•F
- e. () F•F•F•V

21. Durante a aspiração de secreções, uma pressão muito elevada pode causar traumas ao paciente, assim sendo, é importante manter a pressão do aspirador entre:

- a. () 40 e 120 mmHg.
- b. () 60 e 100 mmHg.
- c. () 60 e 140 mmHg.
- d. (X) 80 e 120 mmHg.
- e. () 100 e 140 mmHg.

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à nebulização.

- () A nebulização consiste numa forma de tratar afecções pulmonares por meio de substâncias especiais associadas ao O₂.
- () Durante a nebulização, o fluxo de oxigênio não deve ser superior a 5 ou 6l/min no fluxômetro.
- () O nebulizador deve ser trocado após cada uso e o intermediário deve ser trocado quando o paciente estiver de alta ou quando suspensa a terapêutica com nebulização.
- () Durante a nebulização, o paciente deve ser orientado a permanecer com a boca aberta e inspirar profundamente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) F • V • V • V
- b. () V • V • V • F
- c. () V • V • V • V
- d. () V • F • V • V
- e. () F • F • V • V

23. Para obter uma reanimação cardiopulmonar de qualidade em adultos, o socorrista deve:

1. Comprimir o tórax a uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, ou seja, 5 cm.
2. Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, para facilitar a expansão e a retomada da respiração.
3. Realizar compressões torácicas a uma frequência de 120 a 150/minuto.
4. Aplicar 2 respirações após 30 compressões, cada respiração aplicada em 1 segundo, provocando elevação do tórax.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.

24. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à administração de medicamentos.

- () Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos por via parenteral. Registrar todas as ações imediatamente após a administração do medicamento.
- () Utilizar bandeja contendo diversos medicamentos para diferentes pacientes, no momento da administração.
- () Solicitar revisão por um colega sempre que calcular doses para medicamentos potencialmente perigosos.
- () Padronizar o armazenamento adequado e a identificação completa e clara de todos os medicamentos sob a guarda da equipe de enfermagem.
- () Comunicar ao paciente qual o medicamento que está sendo administrado, mas não especificar qual a sua ação para não causar stress desnecessário.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • V • F • F
- b. () F • V • V • V • V
- c. () V • F • V • V • V
- d. () F • F • V • V • V
- e. (X) V • F • V • V • F

25. Considera-se obeso o paciente adulto, entre 20 e 60 anos de idade, que apresenta um índice de Massa Corporal de:

- a. () 20 a 30 kg/m².
- b. () 25 a 35 kg/m².
- c. (X) 30 a 40 kg/m².
- d. () 35 a 50 kg/m².
- e. () 40 a 50 kg/m².

26. A limpeza concorrente e a terminal programada de uma unidade de saúde devem ser realizadas dependendo da classificação da área.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A limpeza concorrente nas áreas críticas deve ser realizada 3 vezes por dia; na data e no horário preestabelecidos e sempre que necessário.
- () A limpeza concorrente nas áreas não críticas deve ser realizada 2 vezes por dia; na data e horário preestabelecidos e sempre que necessário.
- () A limpeza terminal programada nas áreas semicríticas deve ser semanal, com data, horário e dia da semana preestabelecidos.
- () A limpeza terminal programada nas áreas não críticas deve ser mensal, com data, horário e dia da semana preestabelecidos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•V
- b. () F•V•F•V
- c. () V•V•F•F
- d. () F•F•F•V
- e. (X) V•F•F•V

27. A aspiração de secreções pode ser oronasofaríngea, orotraqueal e por traqueostomia.

Identifique abaixo as afirmativas corretas em relação ao assunto.

1. Durante a aspiração oronasofaríngea o cliente deve ser colocado deitado para facilitar a expansão pulmonar.
2. Sonda número 12 a 16 são adequadas para aspiração em adultos.
3. Na aspiração nasal a sonda deve ser retirada em movimentos firmes e rotatórios com o aspirador ligado.
4. Na aspiração, a manobra de introdução e retirada da sonda nasal não deve ultrapassar 30 segundos.
5. Na aspiração orotraqueal, o diâmetro da sonda não deve ser superior à metade do diâmetro do tubo endotraqueal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. A insulina requer cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e aplicação.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A insulina perde sua potência após um mês do início do uso, especialmente se o frasco for armazenado fora da geladeira.
- () O frasco de insulina deve ser agitado para misturá-la, antes de aspirar seu conteúdo.
- () No uso combinado, aspirar antes a insulina regular para não contaminar o frasco com a insulina de ação intermediária.
- () As insulinas lacradas precisam ser mantidas refrigeradas entre 2°C a 11°C.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•F•V•F
- b. () V•V•F•F
- c. () F•V•V•V
- d. () F•V•F•F
- e. () F•F•V•V

29. Com relação à via de administração de medicamentos, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1 Via

- 1. Subcutânea
- 2. Endovenosa
- 3. Intradérmica
- 4. Intramuscular

Coluna 2 Característica

- () absorção mais rápida do que as outras vias.
- () indicada para medicamento que necessita de absorção lenta e contínua.
- () método de aplicação em "Z" para administração de medicamentos.
- () hipodermóclise.
- () raramente é usada para tratamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1•2•3•4•1
- b. () 2•1•2•1•3
- c. (X) 2•1•4•1•3
- d. () 2•1•4•3•3
- e. () 2•2•1•4•3

30. No que se refere à administração de medicamentos via intramuscular, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1

- 1. Crianças de 6 a 14 anos
- 2. Adolescentes
- 3. Adultos
- 4. Neonatos

Coluna 2

- () Injetar de 2,0-2,5 ml no ventroglúteo.
- () Injetar até 5,0 ml no ventroglúteo.
- () Injetar até 0,5 ml na região deltoide.
- () Injetar de 1,5-2,0 ml no Hochestetter.
- () Injetar até 1,5 ml no vasto lateral.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2•2•3•1•2
- b. (X) 2•3•1•2•1
- c. () 2•3•4•2•1
- d. () 3•1•1•2•4
- e. () 3•2•4•1•2

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>